



U léčby závislosti na alkoholu platí, že na ni přímý lék neexistuje. Léčbu řídí psychiatr, který stanoví léčebný plán s psychoterapií a doporučí podpůrnou lékovou léčbu dle svých zkušeností. Článek pojednává o preparátu Cymbalta.

- [Informace o Cymbaltě na internetu](#)

### **Příbalový leták:**

CYMBALTA 30 mg, 60 mg  
enterosolventní tvrdé tobolky  
Duloxetinum (ve formě duloxetini hydrochloridum)

V: Lilly S.A., Avda. De la Industria, 30, 28108 Alcobendas, Madrid,  
Španělsko.

DR: Eli Lilly Nederland BV, Grootslag 1-5, NL-3991 RA Houten, Nizozemsko.

S: Přípravek Cymbalta je dostupný ve dvou různých silách: 30 a 60 mg.  
Léčivou látkou je duloxetin. Jedna tobolka obsahuje 30 nebo 60 mg  
duloxetinu (ve formě hydrochloridu duloxetinu).

PL: Další látky:

Obsah tobolky: hypromelóza, acetátosukcinát hypromelózy, sacharóza, zrněný cukr, mastek, oxid titaničný (E171), triethyl-citrát.

Tělo tobolky: želatina, natrium-lauryl-sulfát, oxid titaničný (E171), indigokarmín (E132), žlutý oxid železitý (E172) (pouze 60 mg), zelený inkoust (30 mg) nebo bílý inkoust (60 mg).

Zelený inkoust: černý oxid železitý-syntetický (E172), žlutý oxid železitý-syntetický (E172), propylenglykol, šelak.

Bílý inkoust: oxid titaničitý (E171), propylenglykol, šelak, povidon.

CH: Co je přípravek Cymbalta a k čemu se používá

Cymbalta je enterosolventní tvrdá tobolka (tvrdá tobolka rozpustná ve střevě k vnitřnímu užití).

Každá tobolka Cymbalta obsahuje granulky léčivé látky s potahem na ochranu

proti žaludeční kyselině.

I: Přípravek Cymbalta Vám byl předepsán k léčbě deprese nebo léčbě stavu zvaného diabetická neuropatická bolest.

Neuropatická bolest je lékařský název pro stav, kdy je bolest popisována jako palčivá, bodavá, píchavá či vystřelující bolest, nebo je podobná bolesti po ráně elektrickým proudem. V postižené oblasti může dojít ke ztrátě citlivosti, nebo bolest mohou způsobit dotyk, teplo, chlad nebo tlak.

U většiny lidí s depresí začíná přípravek Cymbalta účinkovat v průběhu dvou týdnů od začátku léčby. Váš lékař Vám může dále podávat přípravek Cymbalta, i když se již cítíte lépe, aby se zabránilo návratu deprese.

U většiny lidí s diabetickou neuropatickou bolestí může být účinek přípravku Cymbalta patrný v průběhu jednoho týdne léčby.

KI: Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cymbalta užívat Cymbalta se vydává pouze na lékařský předpis.

Neužívejte přípravek Cymbalta:

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na duloxetin nebo na kteroukoliv další složku přípravku Cymbalta;
- jestliže užíváte nebo jste během posledních 14 dní užíval/a jiné antidepresivní léky nazývané inhibitory monoaminoxidázy (IMAO) (viz níže bod: "Užívání jiných léků");
- jestliže trpíte onemocněním jater;
- jestliže trpíte závažným onemocněním ledvin;
- jestliže užíváte fluvoxamin, ciprofloxacin nebo enoxacin;
- jestliže užíváte jiný přípravek obsahující duloxetin;
- jestliže trpíte nedostatečně léčeným vysokým krevním tlakem.

NÚ: Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Cymbalta nežádoucí účinky, které se ale nemusí projevit u každého. Tyto účinky jsou obvykle mírné až středně těžké a často po několika týdnech ustupují.

Nejčastější nežádoucí účinky přípravku Cymbalta jsou pocit nevolnosti (pocit na zvracení), bolest hlavy, sucho v ústech, problémy se spánkem, únava a průjem. Další časté a méně časté nežádoucí účinky jsou uvedené níže:

Infekce: zánět v krku.

Psychické poruchy: úzkost, pocit neklidu a abnormální sny. Méně časté nežádoucí účinky ovlivňující duševní stav jsou pocit dezorientace, halucinace, pocit ospalosti, častější zívání, nedostatek motivace, sebevražedné myšlenky, chování nebo mánie (porucha, jejímiž příznaky jsou nadměrná aktivita, překotné myšlení a snížená potřeba spánku).

Poruchy nervového systému: závrať, třes nebo pocit necitlivosti, včetně necitlivosti nebo mravenčení na kůži. Méně časté nežádoucí účinky mohou být změna chuti, poruchy pozornosti, záchvaty podobné epileptickým,

ztuhlost, křeče a mimovolné pohyby svalů, pocit neklidu či neschopnost vydržet klidně sedět či stát na jednom místě nebo "serotoninový syndrom" (vzácná reakce, která může vyvolat pocity velkého štěstí, ospalost, nemotornost, neklid, pocit opilosti, horečku, pocení nebo svalovou ztuhlost).

Poruchy trávení: zácpa, nevolnost (zvracení), pálení žáhy nebo plynatost. Také můžete mít sníženou chuť k jídlu a může dojít ke změnám tělesné hmotnosti (snížení nebo zvýšení). Méně časté nežádoucí účinky na trávicí systém jsou říhání, špatné trávení, gastroenteritida (zánět žaludku a střeva), zvýšená hladina cukru v krvi, zápach z úst, přechodně jasně červená krev ve stolici, zvracení krve nebo tmavá stolice.

Poruchy jater: zánět jater, který může způsobit bolest břicha, unavenost a žluté zbarvení kůže.

Poruchy ucha: závrať a bolest ucha.

Oční poruchy: časté je rozmazané vidění, méně časté nežádoucí účinky jsou rozšířené zorničky, porucha vidění nebo zvýšený nitrooční tlak.

Poruchy srdce nebo krevního oběhu: nejčastější nežádoucí účinky jsou pocit bušení srdce, návaly horka nebo zvýšené pocení. Méně časté nežádoucí účinky jsou zčervenání, zvýšení krevního tlaku, pocit chladu v prstech na ruku nebo nohu, pocit závratě (hlavně při prudkém postavení se), rychlý nebo nepravidelný tep, noční pocení, studený pot, svalový třes nebo mdloby.

Poruchy reprodukčního systému: sexuální problémy (včetně problémů s dosažením erekce, změny ejakulace nebo orgasmu, menší sexuální touha), abnormální menstruace včetně silné nebo prodloužené menstruace a příznaky menopauzy.

Poruchy kůže: alergické reakce, vyrážka (svědivá), zvýšený sklon ke vzniku modřin, puchýře nebo citlivost na sluneční světlo.

Poruchy kostí a svalů: bolest svalů, napětí, svalové záškuby, svalová křeč a křeč žvýkacích svalů.

Poruchy močového systému: někteří pacienti potřebují močit v noci, nebo mají s močením potíže nebo močit nemohou. U některých pacientů může mít moč nezvyklý pach.

Celkové poruchy: skřípání zubů, dehydratace, pocity tepla/chladu, žízeň, stažení hrdla, krvácení z nosu, snížení aktivity štítné žlázy, bolest na hrudi či bolest břicha.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích příznaků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

IT: Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Hlavní součástí přípravku Cymbalta, duloxetin, je obsažen také v jiných přípravcích pro léčbu odlišných potíží

(diabetická neuropatická bolest, deprese a močová inkontinence). Měl(a) byste se vyvarovat současného užívání více než jednoho z těchto přípravků. Zkontrolujte se svým lékařem, zda neužíváte další lék obsahující duloxetin.

Váš lékař by měl rozhodnout, můžete-li přípravek Cymbalta užívat v kombinaci s jinými léky. Nezahajujte nebo neukončujte užívání žádných léčivých přípravků včetně léků vydávaných bez lékařského předpisu a bylinných přípravků, dokud se neporadíte s lékařem.

Inhibitory monoaminoxidázy (MAO): přípravek Cymbalta byste neměl/a užívat, pokud současně užíváte, nebo jste v průběhu posledních 14 dní užíval/a, jiný antidepresivní lék nazývaný inhibitor monoaminoxidázy (MAO). Užívání inhibitorů MAO může v kombinaci s užíváním mnoha léků vydávaných na předpis, včetně přípravku Cymbalta, vyvolat závažné, až život ohrožující nežádoucí účinky. Pokud jste přestali užívat některý MAO, musíte počkat alespoň 14 dní, než budete moci začít užívat přípravek Cymbalta. Rovněž je třeba vyčkat nejméně 5 dní poté, co jste přestali užívat přípravek Cymbalta, než začnete užívat některý MAO.

Přípravky způsobující ospalost: oznamte svému lékaři, užíváte-li jakékoliv léky, které Vám způsobují ospalost. Mohou sem patřit přípravky předepsané Vaším lékařem včetně benzodiazepinů, silných léků proti bolesti, antipsychotik, fenobarbitalu, antihistaminik.

Serotoninový syndrom: informujte lékaře, pokud užíváte nějaký lék, který působí podobným způsobem jako duloxetin. K těmto lékům patří např.: triptany, tramadol, tryptofan, některá antidepresiva: SSRI (jako je paroxetin a fluoxetin), tricyklická antidepresiva (jako je clomipramin nebo amitriptylin), pethidin, třezalka a venlafaxin. Tyto léky zvyšují riziko vzniku nežádoucích účinků; vyskytnou-li se neobvyklé příznaky během užívání těchto léčiv společně s přípravkem Cymbalta, vyhledejte lékaře.

Antikoagulační přípravky podávané ústy: informujte lékaře, pokud užíváte antikoagulační přípravky podávané ústy (přípravky "ředící" krev). Tyto přípravky mohou zvýšit riziko krvácení.

**Těhotenství a kojení:**

Informujte svého lékaře, pokud v průběhu léčby přípravkem Cymbalta otěhotníte nebo těhotenství plánujete. Přípravek Cymbalta byste měla užívat pouze tehdy, až s lékařem prodiskutujete možný přínos a všechna potenciální rizika pro nenarozené dítě.

Pokud kojíte, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Užití přípravku Cymbalta v průběhu kojení se nedoporučuje.

Poradte se se svým lékařem či lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

**D: Jak se přípravek Cymbalta užívá**

Vždy užívejte přípravek Cymbalta přesně podle pokynů svého lékaře.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka přípravku Cymbalta je 1 tobolka (60 mg duloxetinu) jednou

denně, avšak dávku, která je správná právě pro Vás, Vám předepíše lékař. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Cymbalta  
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.  
Zapomenete-li užít dávku léku, vezměte si ji ihned, jakmile si vzpomenete. Pokud to ovšem bude v době, kdy máte již užít další dávku, vynechejte zapomenutou a vezměte pouze svou obvyklou jednotlivou dávku. Neužívejte větší dávku přípravku Cymbalta za jeden den, než jaká Vám je předepsána.

Jestliže jste přestala užívat přípravek Cymbalta  
Léčbu nepřerušujte bez konzultace s lékařem ani v případě, že se již cítíte lépe. Jestliže se lékař domnívá, že přípravek Cymbalta již déle nepotřebujete, nejméně 2 týdny před úplným vysazením léčby Vám dávku začne snižovat. Někteří pacienti užívající přípravek Cymbalta měli při náhlém vysazení léku příznaky jako jsou závratě, pocity brnění a mravenčení, poruchy spánku (živé sny, noční můry, neschopnost spát), pocit neklidu nebo vzrušení, pocit úzkosti, pocit na zvracení (nevolnost) nebo zvracení, třes, bolest hlavy, pocit podráždění, průjem nebo nadměrné pocení. Tyto příznaky nejsou obvykle příliš závažné a ustupují během několika dní, ale pokud se u Vás objeví příznaky, které Vás obtěžují, poraďte se s lékařem.

ZP: Přípravek Cymbalta je určen k perorálnímu podání. Tobolku polkněte celou a zapijte ji vodou.

Užívání přípravku Cymbalta s jídlem a pitím

Přípravek Cymbalta lze užívat s jídlem nebo bez jídla. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti, pijete-li alkohol během léčby přípravkem Cymbalta. Pro pravidelné užívání přípravku Cymbalta je jednodušší jej užívat každý den ve stejnou dobu.

Informujte se u svého lékaře na dobu, po kterou budete přípravek Cymbalta užívat. Bez konzultace s lékařem léčbu nepřerušujte.

PŘ: Jestliže jste užil(a) více přípravku Cymbalta, než jste měl/a  
V případě, že užijete vyšší než Vám předepsanou dávku, kontaktujte ihned lékaře nebo lékárníka.

UZ: Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Dokud si neověříte, jak na Vás Cymbalta působí, neřídte dopravní prostředky a neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje.

U: Uchovávání přípravku Cymbalta

Uchovávejte v původním obalu. Uchovávejte při teplotě do 30 st. C.

VA: Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Cymbalta nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP.

BA: Co obsahuje toto balení

Přípravek Cymbalta 30 mg je dodáván v balení po 7, 28 a 98 tobolkách.

Přípravek Cymbalta 60 mg je dodáván v balení po 28, 56, 84, 98, 100 a 500 tobolkách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.