



Hranice mezi kocovinou a alkoholovou intoxikací není přesná, protože kocovina se objevuje ještě v době, kdy je alkohol v krvi. K typickým příznakům kocoviny patří bolesti hlavy, průjem, nechutenství, třes, únava a nevolnost. Pro výzkumné účely se vyžaduje přítomnost alespoň dvou z výše uvedených příznaků v natolik závažné formě, aby došlo k narušení běžných denních činností a povinností. Toliko [Karel Nešpor](#).

Příznaky, projevy kocoviny

- Bolesti hlavy, svalů a kloubů
- Motání hlavy (motace)
- Žaludeční nevolnost na zvracení, zvracení
- Celková rozlada, třes, slabost
- Sucho v ústech
- Dehydratace, "sušák"
- Průjem a nadýmání
- Zvýšená slinivost (hypersalivace)
- Přecitlivělost na světlo a hluk
- Hypoglykémie - snížená hladina cukru v krvi (projevuje se pocením, nechutenstvím, rozmazaným viděním, třesem, necitlivostí rtů a jazyka, podrážděností, mdlobou nebo kolapsem, zmateností, pocitem chladu, nervozitou, slabostí, zrychlením tepu)
 - Po požití alkoholu může docházet k významnému nebo nevýznamnému krvácení do trávicího traktu (především žaludku).
 - Může se dostavovat úzkost a popudlivost.
 - Někdy zimnice.