

U léčby závislosti na alkoholu platí, že na ni přímý lék neexistuje. Léčbu řídí psychiatr, který stanoví léčebný plán s psychoterapií a doporučí podpůrnou lékovou léčbu dle svých zkušeností. Článek pojednává o preparátu ReVia.

- Informace o léku na internetu

Příbalový leták:

REVIA
(Naltrexoni hydrochloridum)
potahované tablety
výrobce

Bristol - Myers Squibb, Rue du Docteur Gilles, 28230 Epernon, Francie.
držitel registračního rozhodnutí

Torrex Chiesi CZ s.r.o., Praha, ČR.
složení - (zpravidla) účinné látky

1 tableta obsahuje: 50 mg naltrexoni hydrochloridum.
složení - pomocné látky

Monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, krospovidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, potahová soustava Opadry žlutá YS-1-6378-G.
indikační skupina

ReVia se používá jako protijed (antidotum).
charakteristika

ReVia snižuje touhu po alkoholu po odvykací terapii a zmírňuje euforické pocity po jeho požití. Účinek přípravku ReVia spočívá ve značné redukci příjmu alkoholu z důvodu snížení touhy po droze.

Protože užíváním ReVia jsou blokována vazebná místa pro opioidy (látky související s vyvoláním závislosti), větší počet pacientů je tak schopen abstinovat a vyhnout se opětovnému

užívání alkoholu.
indikace nebo použití (parafarm.)

Proč máte ReVia užívat?

ReVia se užívá jako podpůrné léčivo v rámci komplexní odvykací terapie při léčbě závislosti na alkoholu.
kontraindikace

Kdy nesmíte ReVia užívat?

ReVia nesmíte užívat při:

- známé přecitlivělosti na Naltrexon nebo pomocné látky obsažené v přípravku;

- užití opiátů pro ovlivnění bolesti bez souhlasu lékaře, který Vám ordinuje přípravek ReVia;

- užití opiátů bez úspěšné odvykací terapie;

- akutních abstinenčních symptomech;

- pozitivním toxikologickém vyšetření na opiáty;

- těžkém onemocnění jater nebo akutní hepatitidě.
nežádoucí účinky

Které nežádoucí účinky se mohou vyskytnout při léčbě přípravkem ReVia

ReVia je obvykle snášena dobře. Případné nežádoucí účinky, které se také mohou vyskytnout během odvykací periody, kdy ReVia není užívána, se obvykle vyskytují jen na počátku léčby a potom odezní.

Nejčastěji se mohou vyskytnout poruchy spánku, úzkost, nervozita, břišní bolesti a křeče, nevolnost, zvracení, pasivita, svalové a kloubní bolesti, bolesti hlavy, ztráta chuti k jídlu, průjem, zácpa, žízeň, zvýšený krevní tlak, deprese, podrážděnost, závratě, kožní vyrážky, opožděná ejakulace, poruchy potence, mrazení, bolesti na hrudi, pocení, zvýšená slzivost.

V jednom případě se vyskytla idiopatická trombocytopenická purpura (onemocnění nejčastěji charakterizované mírným kožním nebo slizničním krvácením), která po odpovídající léčbě vymizela.

Jestliže jste u sebe zpozorovali nežádoucí účinky nebo jiné neobvyklé reakce, okamžitě uvědomte svého lékaře.
interakce

Které léky ovlivňují účinek přípravku ReVia? Účinky přípravku ReVia a účinky jiných současně

užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích které užíváte, a to na lékařský předpis i bez něj.

Během léčby přípravkem ReVia byste neměli užívat jiné léky obsahující opiáty, protože jejich účinek se může vzájemně rušit. Informujte svého lékaře, jestliže potřebujete užívat přípravek proti kašli nebo léky proti průjmu a bolestem. Předepíše Vám léčiva bez obsahu opiátů.
těhotenství a laktace

Na co je třeba dbát při těhotenství a v době kojení?

O užívání přípravku během těhotenství nebo kojení může rozhodnout pouze lékař, s přihlédnutím k poměru užitku a rizika pro matku a dítě.
dávkování

Návod ke právnému užívání

Následující údaje platí, pokud Vám Váš lékař nepředepsal přípravek ReVia jinak.

Obvykle se užívá 1 potahovaná tableta ReVia 1krát denně spolu s malým množstvím tekutiny. Délku léčby určí Váš lékař. Doporučená délka užívání jsou 3-12 měsíců.
předávkování

Předávkování a jiné chyby v užívání

Případy předávkování ReVia nejsou známy.
upozornění (příbalový leták)

U pacientů závislých na opiátech může ReVia vyvolat příznaky podobné závažnému stavu po náhlém odnětí drogy.

Informujte každého lékaře, který Vás léčí, že užíváte ReVia.

ReVia nesmí být užita jinou osobou.

Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů: neuvádí se.
uchovávání (příbalový leták)

Uchovávejte při teplotě do 30 st. C. Vnitřní obal uchovávejte v krabičce, aby byl chráněn před světlem.
informace pro pacienta

Milá pacientko, milý paciente!

Přečtěte si prosím pečlivě následující informace, protože obsahují důležité údaje o tom, na co je třeba dbát při užívání tohoto léku. V případě dotazů se obraťte na svého lékaře.
varování (příbalový leták)

ReVia se nesmí užívat po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
balení (příbalový leták)

1 balení obsahuje 7, 14 nebo 28 tablet.